

## < 甲狀腺機能亢進術前注意事項 >

開刀前藥水作用主要是減少手術時出血及降低甲狀腺危象的發生機率。請務必遵照指示服用。藥水服用方法：請將藥水滴入開水、果汁、仙草蜜稀釋後用吸管喝或是滴在餅乾上吃，不可直接滴入口中，服用藥水有任何問題請與醫師聯絡。

月	日	滴 數		
		早	中	晚
		3	3	3
		3	3	3
		3	3	3
		4	4	4
		5	5	5
		6	6	6
		7	7	7
		8	8	8
		9	9	9
		10	10	10
		11	11	11
		12	12	12
		13	13	13
		14	14	14
		15	15	15

- 1、術前檢查 \_\_\_\_月\_\_\_\_日 星期 \_\_\_\_  
早上 8：30 於掛號處報到，抽血做心肺檢查(前一晚 12：00 過後禁食及禁止喝水)，抽完血即可進食。
- 2、開刀日 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日 星期 \_\_\_\_  
早上 8：30 於掛號處報到，辦理住院手續(前一晚 12：00 過後禁食及禁止喝水)。



員郭醫療社團法人員郭醫院 祝您平安健康!

電話:04-8312889 分機 1127、1123 地址:彰化縣員林市員林大道六段 51 號