


〈帶狀皰疹〉

什麼是帶狀皰疹?

俗稱「皮蛇或飛蛇」，是曾經感染水痘的患者其病毒潛伏脊椎神經節內，直到受到刺激時，潛伏的病毒會再次活躍起來，並沿著神經游走至皮膚上，由於在身體一側成帶狀分部，故稱之。



誘發因素

◎年紀較大者 ◎壓力 ◎酗酒 ◎患有其他內科疾病◎接受外科手術 ◎服用免疫抑制劑

帶狀皰疹的症狀

最早出現的症狀是疼痛，約二至四天後疼痛部位會出現紅疹及水泡，隨後一星期新的紅疹及水泡會繼續出現，患處劇癢、疼痛及全身不適，約七至十天水泡開始慢慢結痂，全身部位均有可能感染，但以胸、腰及顏面部常見。

併發症

- ◎帶狀皰疹癒後神經痛是常見的併發症，此種痛可能持續、數月甚至數年
- ◎繼發性細菌感染
- ◎失明:當病毒侵犯於顏面的三叉神經第一分支區域時，需會診眼科醫師

治療



本院有帶狀皰疹疫苗可供民眾施打

患者應趕緊至醫院的**神經內科**或**皮膚科**就診，由專科醫師診視並給予抗病毒藥物，疼痛者可給止痛藥，若有續發性細菌感染，可給予抗生素藥物治療。



員郭醫療社團法人員郭醫院 祝您平安健康!
電話:04-8312889 分機 1127、1123 地址:彰化縣員林市員林大道六段 51 號